

Uwaga hodowcy drobiu!

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym oraz wysokim zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu zwraca się do hodowców drobiu i wszystkich osób utrzymujących drób przyzagrodowy o zapoznanie się z poniższą ulotką informacyjną.

W ramach zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ptasiej grypy hodowcy drobiu, stosownie do rodzaju gospodarstwa, powinni:

- zabezpieczyć słomę przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzykiwanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
- dokonywać regularnego przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń, np. odchodami dzikich ptaków;
- eliminować wszelkie nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);
- powstrzymać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć istniejące przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Przypomina się, że obecnie wszystkich hodowców drobiu obowiązują zasady określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w tym:

zakazuje się:

- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok/tusz dzikich lub łownych ptaków;

nakazuje się:

- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (oprócz ptaków w mieszkaniach),
- utrzymywanie drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich oraz ich odchodami,
- karmić i poić drób w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których

utrzymywany jest drób,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
- oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- powstrzymać się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informacje dot. liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Należy zawiadomić niezwłocznie lekarza weterynarii w przypadku wystąpienia objawów:

zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki.

